



TIEDOTE VANHEMMILLE PÄÄTÄISTÄ

Lapsenne päivähoitoryhmässä/koulussa on todettu päätäitä.

Päätäihin viittaavia oireita ovat hiuspohjan kutina ja hiuksista ja hiuspohjasta löytyvät täit tai täin munat (saivareet). Niitä saattaa löytyä, vaikka kutinaa esiintyisikään. Täiden ja saivareiden tyypillisimmät paikat ovat niskan ja korvantaustojen hiukset. Päänahan, hiusjuurten ja hiusten tarkastelu pitää tehdä hyvässä valaistuksessa, mahdollisesti suurennuslasia apuna käyttäen. Päätäitartunta todetaan varmimmin kampaamalla tarkoitukseen suunnitellulla kammalla (saatavana apteekista). Täikampausta voidaan tehdä kuiviin hiuksiin, mutta kosteiden, hoitoaineella käsiteltyjen hiusten kampaaminen on helpompaa. Täitartunnan toteamisen jälkeen lapsen tulee olla pois päivähoidosta tai koulusta kunnes ensimmäinen hoitokäsittely on tehty.

PÄÄTÄIT

Täit ovat vaikeasti huomattavia, litteitä, harmahtavia 1-4 mm pituisia loisia. Täitartunta leviää aikuisten täiden, ei munien (saivareiden) välityksellä, tavallisesti suorassa lähikontaktissa ihmisestä toiseen.



Päätäi



Täin munia (saivareita)

TARTUNTA

Lasten läheisissä leikeissä täit tarttuvat suoraan päästä toiseen.

Koska täi voi säilyä hengissä 1-2 vuorokautta olematta ihokosketuksessa, voi leviäminen tapahtua myös kampojen, harjojen, päähineiden, vuodevaatteiden, pyyhkeiden kautta.



PÄÄTÄIDEN HOITO

Hoitona täiden hävittämiseksi on saatavana useita eri valmisteita sekä shampooa että liuoksena:

- Kun lapsi/ aikuinen saa päätäitartunnan, kaikille perheen jäsenille tehdään täitarkastus.
- Tarkastuksen jälkeen tehdään hoito niille, joilla täitartunta todetaan. Jos tartunnan saaneita on perheessä useita, hoito tehdään heille samanaikaisesti, mieluiten saman päivän aikana.
- Hiukset tarkistetaan täikammalla kammaten hiuspohjasta latvoihin saakka 2-3 vrk välein 2 viikon ajan hoidosta sen onnistumisen varmistamiseksi.



-hyönteismyrkkypohjaiset valmisteet -fysikaalisesti ja mekaanisesti toimivat valmisteet (tukehduttavat) ovat esim. silikoniyhdisteitä (dimetikoni) tai öljypohjaisia valmisteita	• Täiden häätöön tarkoitettuja valmisteita käytetään aina apteekin ohjeiden mukaan. Hoidon uusimisen tarve riippuu valmisteesta. Osa vaatii hoidon uusimisen aina 7-9 vrk hoidosta, kun taas joitakin valmisteita käytettäessä hoito uusitaan vain, jos todetaan eläviä täitä. • Mahdollinen päänahan tulehtunut ja rikkonainen ihottuma tulee hoitaa ennen käsittelyä (ota yhteys lääkäriin).
MUUT TOIMENPITEET	• Hiustenhoitovälineet pestään huolellisesti. Harjat ja kammat puhdistetaan upottamalla ne kuumaan veteen (väh. 60°) 30 sekunnin ajaksi. Mikäli vesi on kiehumaa, riittää 10 sekunnin käsittely. • Kahden vrk:n sisällä ennen hoitoa käytössä olleet vaatteet, päähineet, kaulaliinat, vuodevaatteet, pyyhkeet ja lelut pestään yli 60°C pesukoneessa, ja jos mahdollista kuivataan kuivausrummussa kuumalla asetuksella vähintään 5 min. • Vaihtoehtoisesti vaatteita, tekstiilejä ja leluja voidaan pitää 80°C asteisessa kuivassa saunassa 1- 2 tuntia, pakkasessa (-20°C) yön yli tai ilmatiiviissä muovipussissa n. viikko. • Sängyt ja sohvat imuroidaan. Muuten normaali siivous riittää • Koulussa ja päiväkodissa lakit ja huivit on pidettävä omassa laukussa tai takin hihassa.
Huomioitavaa: • Saatavilla olevat hoitovalmisteet eivät irrota kuolleita tai tyhjiä munia hiusvarresta. Useimmat niistä jäävät hoidon jälkeen kiinni ja siirtyvät hiuksen kasvun myötä yhä kauemmaksi päänahasta. • Pelkkä täin munien löytyminen ei siis välttämättä kerro hoitoa vaativasta tartunnasta etenkin jos kyse on lapsesta, jonka hiukset ovat muutamaa viikkoa tai kuukautta aiemmin hoidettu päätäitartunnan vuoksi. • Sen sijaan elävien täiden löytyminen ja saivareiden lisääntyminen on merkki hoidon epäonnistumisesta tai uudesta tartunnasta.	